

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 83 din 27.10.2025**

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile de: **Rapita; cereale paioase de toamna ; lucerniere ; livezi; islazuri; terenuri necultivate.**

Pentru prevenirea si combaterea organismului daunator: **MICROTUS ARVALIS** (soarecele de camp).

Microtus arvalis (soarecele de camp), aceasta specie este activa pe tot timpul anului, chiar sub stratul de zapada. Soarecele de camp ataca partile verzi si cele subterane ale plantelor cultivate, cele mai mari pagube cauzand semanaturilor proaspat rasarite (rapita, cereale paioase), precum si lucernierelor, livezilor, islazurilor si pajistilor naturale. Traieste in galerii subterane, construindu-si cuibul cu numeroase galerii, la 15 – 30 cm adancime. La suprafata galeriile corespund unui numar variabil de orificii. Mai multe orificii grupate, 10 -15/mp formeaza o colonie, iar zona inconjurata de vegetatie care a fost retezata pentru consum reprezinta vatra de atac. Numarul galeriilor si cuiburilor depinde de densitatea acestui daunator.

**1. ARVALIN – 5 buc. /galerie sau
alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.**

Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului : **nr. 1** numai pe parcele unde s-au realizat urmatoarele conditii: Toamna la depistarea daunatorului unde densitatea este de 4-5 col./ha.

Alte recomandari:

Cititi cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr. 127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului, apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare

Maria BOGDAN

BULETIN DE AVERTIZARE**Nr. 84 din 27.10.2025**

Oficiul Fitosanitar Ilfov recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare la culturile de:
CEREALE PAIOASE (grau,orz).

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: **APHIS SPP.** (afide); **MUSTELE CEREALELOR** (oscinella frit;oscinella pusilla).

Afidele ataca culturile de cereale paioase (grau,orz, triticale) inca din toamna si reapar o data cu perioadele calduroase din primavara. Acestea conducand la: stagnarea cresterii si dezvoltarii plantelor (debilitarea plantelor), moartea plantelor (la atacuri masive). Daunele asupra culturilor pot fi atat directe prin colonizare masiva si hranire cat si indirecte intrucat afidele pot fi vectorii pentru transmiterea bolilor. Adultii si larvele afidelor se hranesc cu ajutorul aparatului bucal adaptat pentru intepat si supt. Prin hranire cu sucule celular al plantelor acestea provoaca daune majore culturilor de cereale paioase.

Mustele cerealelor Aparitia acestora este favorizata de toamna tarzie si temperaturi ridicate, ataca culturile imediat dupa rasarire. Larvele si pupele hiberneaza in interiorul cerealelor de toamna sau in graminee salbatice.Pupele se gasesc atat pe resturile vegetale,cat si in sol.Larvele mustei ataca plantele tinere care se afla in faza de 2-3 frunzulite ale culturii,frunza principala,centrala a plantei se ingalbeneste si se smulge usor,este ros mugurele terminal si sesutul bazal al plantelor la care plantele incep sa se usuce cu totul. Aceasta perioada este optima pentru depunerea oualor.O data larva aflata in interiorul mugurelui terminal,nu mai poate fi combatuta. Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare,se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar cu:

1. **DECIS EXPERT 100 EC** - 62,5 ml / ha sau
2. **MAVRIK 2 F / EVURE** - 0,2 l / ha sau
3. **CYCLONE / FASTER GOLD 50 EC** - 0,1 l / ha sau
4. **KARATE ZEON /NINJA** - 0,15 l/ha sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate,peu a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Perioada optimă de tratament: Pragul economic de daunare 10 % plante infestate.

Alte recomandari:

Cititi cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii,de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania,ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei,in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.297/2017privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului,apelor si padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare
Maria BOGDAN

In conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, precum si Ordinul nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Toti utilizatorii profesioniști au obligatia de a completa la zi tratamentele fitosanitare conform modelului mai jos atasat si sa pastreze pentru o perioada de cel puțin trei ani evidenta produselor fitosanitare care sunt utilizate la nivelul fermei.

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg./l)			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

