

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 3 din 12.02.2026

Oficiul Fitosanitar Ilfov, recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare in perioada de repaus vegetativ la: Toate speciile pomicole si plantatiile viticole, pentru combaterea principalilor boli si daunatori : **FOCUL BACTERIAN** (Erwinia amylovora); **RAPAN** (Venturia inaequalis); **FAINARE** (Podosphaera leucotricha), **MONILINIA SPP.** (monilioze) **TAPHRINA DEFORMANS** (basicarea frunzelor); **POLYSTIGMA RUBRUM** (patarea rosie a frunzelor de prun); si alte boli de scoarta, cat si a urmatorilor daunatori:

QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS (paduchele din San – Jose) ; **PANONYCHUS ULMI**; **TETRANYCHUS URTICAE** (acarieni); **ERIOSOMA LANIGERIUM** (paduchele lanos); **PARTHENOLECANIUM CORNI** (paduchele testos).

Tratamentul fitosanitar se va efectua la: **TOATE SPECIILE POMICOLE, PLANTATIILOR DENDROLOGICE, PLANTATIILOR DE VITA DE VIE, TRANDAFIRI ETC.**

Pentru combaterea bolilor folositi unul din produsele:

1. BADCE WG/COPRANTOL DUO -2,62-2,9 kg./ha, la speciile de: mar, par, gutui ; - **3,5 kg./ha**, la speciile de: piersic, nectarin; - **3,9 kg./ha**, la speciile de: cais, cires, prun; - **2,5 kg./ha**, la: vita de vie sau

2. VITRA50 WP/ CUPRIDIN -1,5-2,0 kg./ha, la speciile de: mar, par, gutui, cires, cais, piersic, prun si vita de vie sau

3. AIRONE SC - 4,0 l/ha, la speciile de: cais, cires, prun; - **3,5 l/ha**, la speciile de: nectarin, piersic ; - **3,5 l/ha**, la speciile de: nectarin, piersic; - **3,0 l/ha**, la speciile de: mar, par, gutui; - **2,5 l/ha**, la: vita de vie sau

4. ZEAMA BORDELEZA TIP „MIF”/ZEAMA BORDELEZA VALLES – 3,75- 5,0 kg/ha (cancerul deschis al ramurilor), la speciile de: mar, par, gutui; - **7,5 kg/ha**, la specia de: mar (pentru focul bacterian) sau

5. BOUILLIE BORDELAISE WDG /BORDOMIX – 7,5 kg/ha, la speciile de: mar, par, gutui; - **5,0 kg/ha**, la speciile de: cires, piersic, prun, vita de vie sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Intervalul de timp intre fungicide pe baza de cupru si insecticid cu ulei horticol trebuie sa fie de 2-3 saptamani, pentru combaterea daunatorilor se poate folosi unul din produsele de mai jos:

1. MOSPILAN 20SG / KRIMA 20 SG – 0,450 kg/ha +0,5 % adjuvant (Paduchele din San Jose, tr. de iarna) – la speciile de: mar, prun sau

2. OVIPRON TOP / VERNIL (s.a. -ulei de parafina 800g/l) - 2500 ml / 100 l apa sau (1500 ml / 100 l apa in amestec cu un insecticid), la speciile de: mar, par, prun, cais, piersic, nectarin, cires, vita de vie sau

3. JUVINAL 10 EC - 0,1% (larve hibernante in perioada de iarna), la speciile de: mar, prun sau

4. PLANTOIL / MIDOS OIL- 3,75—15,0 l/ha., la speciile de samburoase, semintoase (Paduchele din San Jose- larve hibernante perioada de iarna) sau

5. ESTIUOIL/ YAGOS – 3,75—15,0 l/ha., la speciile de: cais, cires, gutui, mar, par, nectarin, piersic. (Paduchele din San Jose- larve hibernante perioada de iarna) sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Tratamentul al II-lea se aplica, in fenofaza de umflarea mugurilor floriferi, pentru prevenirea si combaterea unor boli de scoarta si muguri.

Tratamentul se va executa dupa efectuarea lucrarilor de igiena culturala, cum ar fi:

- Indepartarea ramurilor atacate de boli si daunatori;
- Omizitul-indepartarea si distrugerea prin ardere a cuiburilor de omizi;
- Adunarea fructelor atacate si defrisarea pomilor uscati.

Perioada optimă de tratament:

In perioada repausului vegetativ, pentru combaterea formelor hibernante ale paduchilor testosi, dar si a altor daunatori, se executa tratamentul **nr.1** de iarna.

Tratamentul se va aplica la temperaturi de + 5C prin imbaierea completa a coroanei si a trunchiurilor pomilor, in zile insorite ca pomii sa fie uscati, sa nu fie acoperiti cu zapada, polei sau chiciura. Pentru speciile pomicole samburoase tratamentul se va efectua pana la sfarsitul repausului vegetativ- faza de buton alb sau roz, iar pentru speciile pomicole semintoase tratamentul se va efectua pana la fenofaza infrunzitul mugurilor- faza de urechiusa.

Alte recomandari:

Intervalul de timp intre fungicide pe baza de cupru si insecticid cu ulei horticol trebuie sa fie de 2-3 saptamani.

Cititi cu atentie prospectul produselor de protectie a plantelor inainte de utilizare!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator !

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor;

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, cu modificarile ulterioare.

Responsabil Prognoza si Avertizare,
Maria BOGDAN

IN ATENTIA UTILIZATORILOR PROFESIONISTI!

In conformitate cu prevederile art.67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr.1107/2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, precum si Ordinul nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor. Toti utilizatorii profesioniști au obligatia de a completa la zi tratamentele fitosanitare conform modelului mai jos atasat si sa pastreze pentru o perioada de cel puțin trei ani evidenta produselor fitosanitare care sunt utilizate la nivelul fermei.

Num si prenum fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării /fenofaza culturii	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. s. docu prin c a dat cons popu
			Agentul de dăunare: bola/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafata, ha			

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

